



UK Health
Security
Agency



ኤም

ኩፍኝ

ኤም

ጆሮ ደግፍ

አር

ሩቤላ



ክትባት

ይህ በራሪ ወረቀት ስለ ኩፍኝ፣ጆሮ
ደግፍ እና ሩቤላ እና ደም ስለ የ
ኤም ኤም አር የሚባል ከ ሶስቱ
በሽታወች የሚከላከል ክትባትን
የሚገልጽ ነው።



ክትባት

ለሁሉም በማንኛውም እድሜ ላለ ሰው ለመከላከል እምያግዝ

ኩፍኝ

ኩፍኝ

አር

ኩፍኝ

ጆሮ ደግፍ

ሩባላ

ኩፍኝ ምንድን ነው?

ኩፍኝ በጣም ተላላፊ በቫይረስ የሚመጣ በሽታ ሆኖ በሳል እና ማስነጠስ ይተላለፋል። ክትባቱን ያልተከተቡ ከሁኑ እና ደሞ ይህ በሽታ ካለዉ ሰዉ ግንኙነት ላድርገዉ ከሆኑ፡ ይህ በሽታ ወደ እርሶ የመተላለፍ እድሉ በጣም ከፍተኛ ነዉ። ይህ የ ኩፍኝ በሽታ ከያዘት ደሞ በጣም ድካም ሊሰማዎት ይችላል ለ 10 ቀናቶች የሚሆን ደሞ ስራም ከ ትምህርትም ሊያስቀርት ይችላል። ለ ኩፍኝ በሽታ ደሞ ምንም ላይነት ህክምና ወይ ደሞ መድሃኒት የለዉም።

የ ኩፍኝ በሽታ ምልክቶች ትኩሳት፡ የአይን መቅላት እና መቁሰል እና ደሞ ሽፍታ ሊያጠቃልል ይችላል። ይህ ደሞ ለአንዳንድ ሰዎች በጣም ከባድ የሆነ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል።

የጤና ውስብስቦች በተወሰኑ ቡድኖች እንደ የተዳከመ የበሽታ መቋቋም ስርዓት ያላቸው ሰዎች፡ ከ አንድ ላመት በታች ዕድሜ ያላቸዉ ህጻናት እና እርጉዝ ሴቶችን እላይ ሊያጋጥም ይችላል። እነዚ ዉስብስብ ችግሮች ደሞ የ ጆሮና ደረት ኢንፌክሽን፡ መንፈራራር፡ ተቅማጥ፡ ኢንሰ

ፓሊቲከን(የ አንጎል ኢንፌክሽን) እና
በአንጎል ላይ ጉዳት ሊያጠቃልል
ይችላል።እነዚህ ውስብስብ ችግሮች
ያጋጠማቸው ሰዎች ለህክምና ሆስፒታል
ዉስጥ መተኛት ሊያስፈልጋቸው
ይችላል።

አስጊ ነዉ አንዴ? አዎ, አንድ ከ 5000
ኩፍኝ የታመሙ ሰዎች የ ሞት አደጋ
ሊያጋጥመዉ እሚቺል ሲሆን ከ 2006
አመተ ምህረት ጀምሮ በ ኢንግላንድ
እና ዌልስ 3 ሰዎች በዚህ ህመም
ሞተዋል።

ጀር ደግፍ ምንድን ነው?

ጀር ደግፍ በቫይረስ የሚመጣ ህመም ሆኖ በሰል እና ማስነጠስ እናም የ ጀር ደግፍ በሽታ የተጠቃ ሰው ጋራ ቅርብ ግንኙነት በማድረግ ሊተላለፍ ይችላል።

የ ጀር ደግፍ ምልክቶች ብዙ ጊዜ እስከ ሁለት ሳምንታን የሚቆይ ሆኖ ትኩሳት እና የራስ ህመም ሊያጠቃልል ይችላል። ግን ደሞ ብዙ ጊዜ የሚታየው ምልክት ፊታችን ላይ በሳን ያሉትን እጢዎችን ማበጥ ነው። እሄ ደሞ የ ሃምስተር ፊት የሚመስል እብጠት ያለው ፊት እንዲኖርክ ያረጋል እናም ህመም ሊያረክ ይችላል እና ለ መዋጥ ሊያስቸግር ይችላል።

የጤና ውስብስቦች የ ጀር ደግፍ የጤና ውስብስቦች ብርቱ ሊሆን ይችላል እናም የ ማሃጸን እና የ ዘር ፍሬን አብጠት በተወሰነ ጊዜያት ደሞ የ ቆሽት ማበጥ ወይ መቁሰል ሊያስከትል ይችላል። ከዚ በተጨማሪ ደሞ ጀር ደግፍ በቫይረስ የሚመጣ መኒንጃይትስን ኢንሰፕላሊቲስ (የ እንጎል ኢንፌክሽን) ሊያስከትል ይችላል። ምንም እንኳን የመስማት ችሎታችን በቀዋሚነት ሊያጠፋው የሚችልበት (በቀዋሚነት መደንቆር) አጋጣሚ ብዙ ባይሆንም፡ 1 ከ 20 በ ጀር ደግፍ የተጠቁ ሰዎች ግዝያዊ የጀር መደንቆር ሊያጋጥሟቸው ይችላል።

እስከ አሁኑ ጊዜ ጀር ደግፍ ለመሬወስ የሚያስችል መድሃኒት የለም፡ ስለዚ ደሞ የ ጀር ደግፍ ፍወሳ ለሚታዩ ምልክቶችን እንዲረጋገጡ በማድረግ ነው

የሚፈጸም። ጀር ደግፍ በሽታ ከያዘክ አልጋ እላይ እረፍት እና የህመም ማስታገሻ መድሃኒት መውሰድንም ሊያስፈልግዎት ይችላል። እናም ቀለል ያለ እና ብዙ ማኘክ የማያስፈልገው የምግብ አይነት ሊያስፈልግት ይችላል። በዚ ጊዜ እየታየ ያለው የ ጀር ደግፍ በሽታ በብዛት ሁለቱንም የ ኤሚ ኤም አር ክትባት ባልወሰዱት ታዳጊ ወጣቶች እላይ ነው እየታየ ያለው።

ሩቤላ ምንድን ነው?

ሩቤላ በ ቫይረስ የሚተላለፍ በሽታ ሆኖ ብዙ ጊዜ የ ጀርመር ኩፍኝ ተብሎም የሚጠራ ነው። ምስጋና ለ ስኪታማነት የ ኤምኤምአር ክትባት ሩቤላ በ ታላቋ ብሪታኒያ ብዙም አይታይም። ልክ እንደ ኩፍኝ እና ጀር ደግፍ በተመሳሳይ መንገድ ይተላለፋል። ብዙ ሰዎች እላይ ደሞ መካከለኛ እሚባል ሁኔታ የሚያስከትል ሆኖ ያለ ምንም ህክምና ከ 7 እስከ 10 ቀናቶች ባለ ጊዜ በራሱ የሚያገግም ነው። ሆኖም ግን፡ነብሰጡር እናቶች ሩቤላ ከታየባቸው ሆዱዋ ወስጥ ላለው ያልተወለደው ህጻን በጣም አደገኛ ነው።

የ ሩቤላ ምልክቶች እንደ ሽፍታ፣ ጉንፋን የሚመስል ምልክቶች እና በጣም ህመም ያለው መገጣጠም ያዎች ያጠቃልላል።

የጤና ውስብስቦች የ ሩቤላ ብዙ የተለመደ እንኳን ባይሆንም ነብሰጡር እናቶች በ እርግዝና ጊዜያቸው ሩቤላ ከያዛቸው ደሞ ላልተወለደው ህጻኑ በጣም አደገኛ ሊሆን ይችላል። ህጻኑ ሲወለድ የዓይን ሞራ ግርዶሽ (የዓይን

ኹግሮኹ) : የ ጅሮ መዶንቆር፡ የ ልብ
ኹግሮኹ እና ጉዳት አንጎል ላይ ይዞ
ሊወለድ ይኹላል።

1

አንድ ክትባት

ክትባት ኤም ኤም ኦር አንድ መርፌ ሆኖ ትናንሽ ልጆች ላይ በጭናቸው እላይ ትላልቅ ልጆች እና ጓልማሶች እላይ ደሞ የላይኛው ክንዳቸውን እሚወጡት ነው። ይህ ክትባት ደሞ ህያዉ ክትባት ነዉ ይህ ማለት ደሞ የተዳከሙ ስሪቶች የ ከፍኝ፡ጆሮ ደግፍ እና ሩቤላን ቫይረስ ያለዉ ነዉ። እነዚ ደሞ በሽታ ሊያስከትሉ እማይችሉ የተዳከሙ ስሪቶች ሆኖዉ ሰዉነታችን ደሞ ለንደዚ ኣይነት ቫይረስ የ መከላከል ኣቅም አንዲያገለብት ያስችለዋል።



2

ሁለት ክትባት

ክትባት ኤም ኤም ኦር ሁለት ክትባት ከወሰድን ነዉ ለ ረጅም ጊዜ የሚቆይ የመከላከል ኣቅም ሊሰጠን የሚችለዉ። ያቺ የመጀመርያ ክትባት በ 12ኛዉ ወር ዕድሜያችን የምትሰጥ ሆና ሁለተኛዋ ክትባት ደሞ በ 3 ዓመት ከ 4 ወር ዕድሜያችን ይወሰዳል። ይህ ደሞ ትምህርት ከመጀመራችን በፊት ነዉ። ሁለቱ ክትባት ከወሰድን ደሞ ለ ረጅም ጊዜ የሚቆይ ለ ንፍቶ፡ጽግዕን ፍሮማይን በሽታዎች የመከላከል ኣቅም ይሰጠናል። በ ትላልቅ ልጆች እና ጓልማሶ ሰዎች እነዚ ሁለት ክትባቶች የአንድ ወር የጊዜ ልዩነት በማድረግ ሊወሰዱ እሚችሉ ናቸዉ።



3

ሶስት ኢንፌክሽኖች

ክትባት ኤም ኤም ኦር ከሚከተሉት ሶስት ኢንፌክሽኖች ይከላከላል፡ ከፍኝ፡ጆሮ ደግፍ እና ሩቤላ። እነዚ ደሞ በ ቫይረስ የሚተላለፉ ሆነዉ በ ያልተከተቡ ልጆች እና ጎልማሳ ሰዎችን እላይ በጣም ተላላፊ ነዉ። ከ ኢንፍሊንዛ እና ጉንፋን በላይ በቀላል ሊተላለፍ ይችላል።



ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የመከላከል ኣቅም

ክትባት ኤም ኤም ኦር በጣም አስተማማኝ እና በጣም ውጤታማ የሆነ አራስህን ከ ከፍኝ፡ጆሮ ደግፍ ሩቤላን በሽታዎች እምትከላከልበት መንገድ ነዉ። ይህ ክትባት በ 1988 ኣመተ ምህረት ሊሰጥ ከጀመረ ጀምሮ በ ታላቋ ብሪታንያ እነዚ በሽታዎች በብዛት እየታዩ

አይደሉም። እሄ ሆኖም እያለ ግን ይሄንን ክትባት የሚወስዱት ሰወች ቁጥር ግን እየቀነሰ ሲሄድ የነዚ በሽታዎች በተለይ ደሞ የ ኩፍኝ ወረርሺኝ ታይቶ ነበር። ካሁን በፊት ይሄንን ክትባት መወሰድህን ወይ አለመወሰድህን እርግጠኛ ካልሆኑ ለ ሃኪምህን ጠይቀው፤ እሄ ሆኖም እነዚ ክትባቶች ደግመክ መወሰድ ምንም አይነት ጉዳት የሚያስከትል አይደለም።

ማን ነዉ እነዚ ክትባት መከተብ ያለዉ?

ትናንሽ ልጆች

ትናንሽ ልጆች በ ብሔራዊ የ ታላቋ ብሪታንያ የክትባት መርሃ ግብር መሰረት ይሄንን ክትባት ሊሰጣቸዉ ይገባል። ሁለት ክትባት ደሞ ሊሰጣቸዉ ነዉ። የመጀመርያዋ ክትባት ዕድሜያቸዉ አንድ አመት ከሞላቸዉ ብሁዋላ የሚሰጥ ሆኖ ሁለተኛዋ ክትባት ደሞ ትምህርት ከመጀመራቸዉ በፊት በዙ ግዜ እድሜያቸዉ 3 አመት ከ 4 ወር አከባቢ ሲደርስ ይሰጣሉ።

ትልልቅ ልጆች፣ ጎረምቦች እና ጎልማሶች

ካሁን በፊት ክትባት ኤም ኤም ኣር ያልተከተብክ ወይ ደሞ አንድ ክትባት ብቻ ተከትብክ ያቺ ሁለተኛዋ ያልተከተብክ ከሆንክ፣ ቀርቶክ ላለዉ ክትባት ለመወሰድ ለ ሃኪምክን ኣናግረዉ። ካሁን በፊት ትንሽ ልጅ ሆነክ አንድ ክትባት ኤም ኤም ኣር ወስደክ ከሆንክ ኣሁን ሁለተኛዋ ክትባት ብቻ ነዉ የምትወስደዉ አንደኛዉ ክትባት ከወሰድክ ምንም ያህል ግዜ ቢሆንህም። ሁለቱ ክትባት የሚያስፈልግክ ከሆነ ደሞ የ አንድ ወር የግዜ ልዩነት በማድረግ ሁለቱም ክትባት መወሰድ ይችላሉ።

ልጅ መወለድ በሚችሉበት እድሜ ላሉ ሴቶች

ሩቤላ ላልተወለደ ህጻን በጣም ኣደገኛ

እንፌክሽን ሊሆን ይችላል። ዓይነ ስውርነት፣ የጆሮ መዶንቆር ከዛም ብሶ ሞት ሊያስከትል ይችላል። ልጅ መወለድ በምትችሉበት እድሜ ያለሽ ሴት ከሆንሽ፣ ልጅ የመወለድ እቅድ ባይኖርሽም ከማርገዝሽ በፊት ሁለት ክትባት የ ኤም ኤም ኣር መከተብ ኣለብሽ። ሁለቱን ክትባት ካልወሰድሽ ወይ ደሞ ሁለቱን ክትባት መወሰድሽ እርግጠኛ ካልሆንሽ ደሞ ሃኪምሽን ኣነጋግረሽ የቀረሽን ክትባት መወሰድ ኣለብሽ። ይሄ ክትባት ህያዉ ክትባል ስለ ሆነ ደሞ ከመከተብሽ ቡኋላ ለ አንድ ወር ከ ማርገዝ ተቆጠቢ ስለዚህ በዚህ የ አንድ ወር ጊዜ ውስጥ እስተማማኝ የእርግዝና መከላከያ ዘዴን መጠቀም ኣለብሽ። ነብሰጡር ወይ ደሞ በቅርብ የወለድሽ ኣራስ ከሆንሽ እና ይሄንን ሁለት የ ኤም ኤም ኣር ክትባት መወሰድሽን እርግጠኛ መሆን ካልቻልሽ ደሞ ለ ሃኪምሽ ወይ ለ ነርስ ከመወለድሽ ቡኋላ ከ 6 ሳምንታት ሁኋላ ከነሱጋራ ባለሽን ቀጠሮ ላይ ንገረያቸዉ።

ትላልቅ አዋቂዎች

ከ 1970 አመተ ምህረት በፊት በ ታላቋ ብሪታንያ የተወለዱ ሰዎች ኩፍኝ፣ጆሮ ደግፍ እና ሩቤላን በሽታዎች ባለፈ ዘመናቸዉ ታመዉ ሊሆኑ ይችላሉ ወይ ደሞ ኤም ኤም ኣር በ 1988 አመተ ምህረት ሊሰጥ ከመጀመሩ በፊት የሚሰጥ የነበረዉን አንድ ክትባት የ ኩፍኝ ወይ ሩቤላ ተከትብዉ ሊሆኑ ይችላሉ። ካሁን በፊት እነዚን በሽታዎች ታመክ መኖርክ ወይ ደሞ ክትባቱን

መከተብህን ወይ አለመከተብህን
እርግጠኛ መሆን ካልቻልክ ለ ሃኪምህን
እነዚን ክትባቶች እንዲሰጥክ አናግረዉ።
ሁለት ክትባት መወሰድ ያስፈልግሃል የ
አንድ ወር የ ጊዜ ልዩነት በማድረግ ደሞ
ሁለቱን ክትባት ይወስዳሉ። እነዚ
ክትባቶች ካሁን በፊት ወስደዉት ከሆኑ
እንኳን ድጋሜ ሲወስዱት ሰወነትዎ
እነዚን ቫይረስ ስለሚያቃቸዉ እና ደሞ
በፍጥነት ስለሚገድላቸዉ ምንም ጉዳት
የሚያከትል አይደለም።

ሌላ ሃገር ከተወለዱ ወይ ደግሞ ከ ሌላ ሃገር ከመጡ?

በ ሌላ ሃገር ከተወለዱክ ወይ ደግሞ ከ ሌላ ሃገር ከመጣክ ሁለት ክትባት ሌም ሌም ኣር ሊያስፈልገት ይችላል። የተለያዩ ሃገሮች የተለያዩ የክትባት መንገድ ይከተላሉ በዛላይ ደግሞ ሁሉም ሃገሮች ሁለት የ ሌም ሌም ኣር ክትባት ኣይጠቀሙም። የተከተብክበት መዝገብ ወረቀት ከሌለክ ወይ ደግሞ እርግጠኛ ካልሆንክ ከ ሃኪምህ ጋራ ተነጋገር። እሄ እንዳለም ከ ሌሎች በሽታዎች የሚከላከሉልክ ሌላ ክትባቶች ሊያስፈልጉክ ይችላሉ።

የ ሌም ሌም ኣር ክትባት እንዴት ነው የሚሰራው?

ክትባት ሌም ሌም ኣር ህያወ ክትባት ሆኖ ከ ኩፍኝ፣ጅሮ ደግፍ እና ፍቤላ የሚከላከል ነው።ሁለት ክትባቶች ሆነው እግር ላይ ወይ ደግሞ በላይኛው ክንድ ላይ የሚወጉት ነው። የ ሰውነታችን በሽታ የመከላከል ስርአት ደግሞ እነዚህ ሰባት ቫይረስ የሚያወቁዋቸው እና የሚያስታወስዋቸው ሕዋሳት በጣም ረት መልስ ይሰጣል። ወደፊት ደግሞ ወደ እነዚህ በሽታዎች ከተጋለጡ፣ እነዚህ ሕዋሳት ይነሱ እና ሰውነትዎ ደግሞ በጣም በፍጥነት ጸረ ነፍሳት (ለመከላከል የሚያስችሉ) ያመርታል። እነዚህ ደግሞ ለረጅም ጊዜ የመከላከል አቅም ይሰጣል።



ክትባቱ ምን ያህል ደህንነቱ የተጠበቀ ነው።?

ለብዙ አመታት በብዙ ሃገራት አለም ሁለቱ ክትባት ሌም ሌም አር ለልጆች ደህንነቱ የተጠበቀ የ መከላከል አቅም እየሰጣቸው ይገኛል። በ ታላቋ ብሪታንያ፣ በ 1988 አመተ ምህረት መሰጠት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በ ሚሊዮን የሚቆጠሩ ክትባት ተሰጥተዋል። ክትባቶች ጥቅም ላይ ከመዋላቸው በፊት የ ዋስትና ፈተና ይደረግላቸዋል። ምንም እንኳን አንድ አንድ የ የጎንዮሽ ጉዳዮች ቢኖራቸው፣ ብዙ ጊዜ የሚታዩ የጎንዮሽ ጉዳት መካከለኛ እና እራሱ በሽታዉ ከሚያስከትለው የጤና እክል በጣም የተሻለ ነው። ከ ክታብቱ ቡኃላ በሰዓዊታችን የሚታይ ከባድ የጎንዮሽ ምልክቶች የመከሰት እድል በጣም ትንሽ ነው።

የ ሌም ሌም አር ክትባት ዋስትና እና ዉጤታማነት ለማረጋገጥ በጣም ብዙ ጥናቶች ተካሂደዋል። ያሉት ማስረጃዎች እሚያሳዩት ደሞ ክትባት ሌም ሌም አር ከ ተቲዝም ጋራ ምንም ተያያዥነት እንደሌለው ነው።

ግን ይሰራል?

አዎ፣ ይህ ክትባት ለ ኩፍኝ፣ ጆሮ ደግፍ እና ሩቤላን መከላከል ላይ በጣም ዉጤታማ ነው። ሁለቱም ክትባት የወሰዱ ሰዎች ከ

99% በላይ ለ ኩፍኝ እና ሩቤላን የመከላከል አቅም አላቸው። ለ ጆሮ ደግፍ በሽታ ደሞ ምንም እንኳን ዝቅ ያለ ቢሆንም በተከተቡ ሰዎች ላይ የ ህመም ስሜት ግን በጣም የተሻለ ነው። ሌም ሌም አር በ 1988 ነው በታላቋ ብሪታንያ መሰጠት የጀመረው። አሁን በዚ ጊዜ ደሞ ልጆች በነዚ በሽታዎች ሲጠቁ ብዙ አይታዩም። ከ ቅርብ አመታት በፊት የ ኩፍኝ እና ጆሮ ደግፍ ወረርሺኝ ታይቶ ነበር። ይህ ደሞ ክትባቱን የሚከተቡት ሰዎች ቁጥር ከቀነሰ ብኃላ የታየ ወረርሺኝ ነው። ሆኖም ግን ይህ ወረርሺኝ በ ማንኛውም ጊዜ ሊታይ ስለ ሚችል ሰዓዊታችን ሁለቱም የ ሌም ሌም አር ክትባት ወስዶ ተገቢ የመከላከል አቅም ማዳበሩን አረጋግጥ።

የዚ ክትባት የጎንዮሽ ጉዳዮች ምንድናቸው?

ሁሉ የተከተቡ ሰዓዊታችን የጎንዮሽ ጉዳት ያሳያል ማለት አይደለም። ተገቢ የመከላከም አቅም ለመስጠት፣ ይህ ክትባት ለነዚ 3 ልንከላከላቸው ፈልገን ያለን ሊንፊኮች ሰዓዊታችን ዉስጥ አስመስሎ እንደ ሚፈጠሩ ያደርጋል። በ አንድ አንድ ሰዎች ደሞ ሽፍታ የሚመስል ቀለል ያለ ኩፍኝ፣ የ ፊታችን ማበጥ (ጆሮ ደግፍ የሚመስል) እና ደሞ የ አሰዉነታችን መገጣጠሚያዎች ላይ የ ህመም ስሜት እና ሩቤላ የሚመስል ሊታይ ይችላል። እነዚ የጎንዮሽ ጉዳዮች በ ትንሽ ሰዎች የ መጀመርያዉን ክትባት ከወሰዱ በኋላ ይታያል።

ብዙ ጊዜ የክታብቱን የ ኩፍኝ ክፍል
ጎንዮሽ ጉዳዮች በ 6 እስከ 10 ቀናቶች
ከ ክትባቱ መወሰድክ ቡኋላ ክትባቱ
ስራዉ ከጀምረ ቡኋላ ነዉ የሚታየዉ። የ
ፊት እብጠት ወይ ደሞ ህመም የ
ሰዉነታችን መገጣጠም ያዎች ላይ በ 2
እስከ 3 ሳምንታት ከክትባቱን ቡኋላ ያ የ
ሩቤላ እና ጆሮ ደግፍ የክትባቱን ክፍል
ስራዉን መስራት ሲጀምር ነዉ
የሚታየዉ።

የ ጎንዮሽ ጉዳዮች እንደ ሸፍታ፡የ እንገታችን ማበጥ 2 እስከ 3 ቀናቶች የሚቆይ እና ደሞ የማይተላለፍ ነው። ይህ ማለት ደሞ እነዚህ ምልክቶች የ ጎንዮሽ ጉዳዮች ሰውነትክ ወስጥ ከታዩ ወደ ሌላ ሰው ሊተላለፉ አይችሉም ማለት ነው።

በተወሰኑ አጋጣሚዎች፡ ቀይ ወይ ሃመር ቀለም ያለው ጥቃቅን ቁስሎች የሚመስል ሸፍታ ከ ክትባቱ ቡኋላ እስከ 6 ሳምንታት ሊታይ ይችላል።

ክትባት መወሰድ አለበት።

ኩፍኝ ወደ የ ሌም ሌም አር ክትባት መወሰድ የማይችሉ ህጻናትን ወይ ደሞ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎችን ከተላለፈ ደሞ በጣም ከባድ የጤና መዘዝ ሊያስከትል ይችላል። እንደ ማስጠንቀቂያ፡ ሴቶች የ ሌም ሌም አር ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ እስከ አንድ ወር እርግዝና እንዳይዙ መጠንቀቅ አለባቸው።

ለምን እኔ ወይ ልጆቼን ለዚህ ክትባት እንከተባብራለን?

ለራስዎ ከእነዚህ 3 ተላላፊ በሽታዎች ለመከላከል ይህ ክትባት መከተብ አለበት። ይህ ክትባት በመከተባቸው ደሞ ለሌሎች ክትባቱን መወሰድ አማይችሉ ሰዎች ጭምር ልትከላክልላቸው እሚያስችልክ ነው። እነዚህ ሰዎች ደሞ ያልተወለዱ በርግዝና ላይ ያሉ ህጻናት፡ ለዚህ ክትባት ለመውሰድ እድሜያቸው ያልደረሰ ጩቅላ ህጻናት እና ደሞ ደካማ የሰውነታቸውን የመከላከል ስርአት ያላቸው ልጆች ወይ አዋቂዎች ናቸው። ይህ ደሞ የእነዚህ በሽታዎች ወረርሺኝ እንዳያጋጥም ያግዛል።

ከ ትናንሽ ልጆች ጋራ የምትሰራ ከሆንክ ወይ ደሞ ሌሎችን መንከባከብ ላይ እምትሰተፍ ከሆንክ ደሞ ይህ



ክትባት

ኤምኤምኦር

ገላቲን አለዉ

ወይ?

በ ታላቋ ብሪታንያ፡ ሁለት
 በጣም ዉጤታማ የ ኤም
 ኤም ኦር ክትባት ኣሉ።
 ኣንዳቸዉ ገላቲን የሚባል ከ
 ኣሳማ የሚገኝ ፕሮቲን ንጥረ
 ነገር ሲኖሮው ሁለተኛዉ
 ኣይነት ደሞ ይሄ ገላቲን
 እሚባል ፕሮቲን የሌለዉ ነዉ።
 ያ ገላቲን ፕሮቲን የሌለዉ
 ክትባት መዉሰድ ከፈለግክ ለ
 ነርስ ወይ ደሞ ለ ሃኪምክ
 ያማክሩላቸው።

ኩፍኝ፡ ጆሮ ደግፍ እና ፍብላ ይዞኝ ይሆናል ብለው ካሰቡ፡ ወደ ሌሎች ሰወች እንዳይተላለፍ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው። ማረጋገጫ ያለበት ደም፡

- ምክር ለማግኘት ለ ሃኪምክ ደውልለት፡ ምናልባት በቀኑ በ መጨረሻ ሰአታት ወደ ህክምና መጥተክ እንድታገኘው ሊያረጋገጥ ይችላል ይሆናል። ይህ ማድረግ ደም ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑት ሰዎች እንደ ትናንሽ ልጆች እና ነብሰጡር እናቶች ታካሚዎች መነካካት እንዳይፈጠር እና በሽታው እንዳይተላለፍ ነው።
- ይህ ምልክቶች መታየት ከ ጀመረበት ጊዜ ጀምረክ ከ ስራም ትምህርትም በትንሹ ለ 4 ቀናቶች አቋርጥ።
- ከ በሽታው ካገገምክ ቡኋል ደም ቀርቶክ ላለው ክትባቶችክን ለመወሰድ ዝግጁት አድርግ፡ ይህ ክትባት መወሰድ ደም ከሌሎች ሁለቱ በሽታዎች ይከላከልልሃል።

ክትባት ሌም ሌም ኣር መከተብ የሌለባቸው ሰዎች ኣሉ ወይ?

ክትባት ሌም ሌም ኣር ህያው ክትባት ስለ ሆነ ለነብሰ ጡር እናቶች እና ለ ደካማ በሽታ የመከላከል ስርዓተ ሰወነት ያላቸው ሰዎች ለምሳሌ የ አጥንት መቅን የተተከለላቸው ሰዎችን ወይ ደም የ ሰወነታቸውን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ለመቀነስ መድሃኒት የሚወስዱ ሰዎች ክትባቱን መሰጠት የለበትም።

እርግጠኛ ካልሆንክ ከ ሃኪምክ ጋራ ተነጋገር። ሰወነትክ ኔኦምዶሲን የሚባል መድሃኒት ከተጠቀምክ ኣናፊላክቲክ የሚባል ኣለርጂ እንደምታዳብር ከተረጋገጠልክ ይህ ክትባት መከተብ የለበትም። ሰወነትክን ገላቲን ከወሰድክ ኣናፊላክቲክ የሚባል ኣለርጂ እንደሚያሳይ ከተረጋገጠልክ ከ ሃኪምክ ጋራ ተነጋግረክ ከ ገላቲን ነጻ የሆነ ክትባት መከተብ ኣለብክ።

የ እንቁላል ኣለርጂ

ሁሉም የ እንቁላልኣለርጂ ያላቸው ሰዎችን እና አስም ያላቸው ልጆችን ጨምሮ ይህ ሌም ሌም ኣር ክትባት በ ጂፒ ሕክምና መከተብ የሚችሉ ናቸው። ምንም ኣይነት ለ ሌም ሌም ክትባት ከወሰዱ ኣናፎላክቲክ ኣለርጂ ኣንዳላቸው የሚገልጹ ዶኩመንት ካላቸው በየኣለርጂ ሃኪምዎት መመርመር ኣለባት።

ምልክቶቹ ምንድን ናቸው?

ኩፍኝ

ትኩሳት፡ የገንፋን ምልክት፡ ሸፍታ፡የቆሰለ ወይ የቀለ አይን

ጀሮ ደግፍ

ትኩሳት፡ የጭንቅላት ህመም እና ፊትዎ እላይ ያበጡ እጢዎች

ሩባላ

ያበጡ እጢዎች፡የጎሮሮ ህመም፡ትኩሳት እና ሸፍታ

ከቢድ ነገር ድዩ?

አዎ

1 ከ 5 የታመሙ ሰዎች ወደ ሆስፒታል ይሄዳሉ፡ 1 ከ 15 ደሞ ከባድ የጤና ውስብስብነት ያሰከትልላቸዋል።

ኩፍኝ የ ጀሮ መደንቆር፡መንፈራፈር፡አንጎል ላይ ጉዳት፡ የአንጎል እብጠት ሊያመጣ ይችላል። በታላቋ ብሪታንያ ከ2006 ጀምሮ 3 ሞት በኩፍኝ ታይቶዋል።

አዎ

ምንም እንኳን ብዙ ግዜ ምልክቶቹ መካከለኛ ቢሆኑም፡ ጀሮ ደግፍ እንደ ተላላፊ መኒንጃይትስን እና እብጠት/ህመም የማህጸን ወይ የዘርፍሬ በጣም አልፎ አልፎ ደሞ የቆሽትን ሊያሰከትል ይችላል።

አዎ

ምንም እንኳን ምልክቶቹ መካከለኛ ቢሆኑም፡ ሩባላ በሽታ በእርግዝና ግዜ ካጋጠመ ላልተወለደው ህጻን ጉዳቱ ከባድ ሆኖ እንደ የጀሮ መደንቆር፡ ዓይነ ስወርነት ከዛ ብሶም ሞት ሊያሰከትል ይችላል።

ማን ነዉ እነዚ ክትባት መከተብ ያለባቸዉ?

- ሁሉም ከ 1 ዓመት በላይ እድሜ ያላቸዉ ልጆች 2 ክትባት መወሰድ አለባቸዉ፡ የመጀመርያዉ ክትባት በ አንድ አመት እድሜያቸዉ መወሰድ ያለበት ሆኖ ሁለተኛዉ ክትባት ደሞ ብዙ ጊዜ በ ሶስት አመት ከ ኣራት ወር እድሜያቸዉ ይከተቡታል።
- ትላልቅ ልጆች እና ኣዋቂ ሰዎች ሁለቱ ክትባት መወሰድ አለባቸዉ ይሄ ክትባት ደሞ የ አንድ ወር የጊዜ ልዩነት ኣርገዉ መከተብ ይችላሉ።
- ነብሰ ጡር እናቶች እርግዝና ከመያዛቸዉ በፊት ይሄንን ክትባት ተከትበዉ መሆናቸዉን እርግጠኛ መሆን ኣለቦት ወይ ደሞ ከ ወሊድ ቡኃላ በ ኣጭር ጊዜ መከተብ ኣለባቸዉ።



ሁለቱም ክታባት ኣልፎኛል ሳትል በየትኛዉም ጊዜ መከተብ ይቻላል

ይሄ ክትባት የት ላገኘዉ እችላለዉ?

በ ጂፒ ሕክምናክ

- ሁሉም ከ አንድ አመት እስከ ሶስት አመት እና ኣራት ወር እድሜ ያላቸዉ ልጆች በ መደበኛ ክፍል የ ክትባቶቹን በ ጂፒ ህክምና ሊሰጣቸዉ ይገባል።
- ትላልቅ ልጆቹ እና ኣዋቂ ሰዎችን አንድ ክትባት ብቻ ተከትበዉ ከሆኑ ወይ ደሞ ምንም ያልተከተቡ ከሆኑ ለ ጂፒ ህክምናዎ ማናገር ኣለቦት።
- ሁለቱ ክትባት ያልወሰደች ነብሰ ጡር እናት ከ ወሊድ ቡኃላ በ ጂፒ ህክምናዎ ይሄንን ክትባት መወሰድ ኣለባት።

ትምህርት ቤት ዉስጥ

አንድ አንድ ጎረምሳዎች እና ወጣት ጎልማሶች ላለፋቸዉ የ ኤም ኤም ኣር ክትባት ከሊሎች ልጆች ጋራ ሊሰጣተዉ ይችላል።

ከ ኣሰሪዎ የ ስራ የጤና ኣገልግሎት

የ ጤና ኣገልግሎት ሰራሕተኛዎች ቀጥታዊ ግንኙነት ከ ታማሚዎች ጋራ ያላቸዉ ከሆኑ ይሄ የ 3 በሽታዎች ክትባት መወሰዳቸዉ እርግጠኛ መሆን ኣለቦት።

ኩፍኝ፡ ለልጆች
ብቻ የሚመለከት በሽታ
አይደለም



ስለ ኤም ኤም ኣር ክትባት ከዚህም በላይ መረጃ ክፈለጉ በዚ ቀጥሎ ባለ ውብሳይት ይመልከቱ

www.nhs.uk/conditions/vaccinations/pages/mmr-vaccine.aspx



© ክራ.ዉ.ን የቅጂ መብት 2022
3219250 2p 75K MAR 2020
(APS)

የመጀመርያ ቅጂ ሰኔ 2016

ይሄ ጽሑፍ የዚ ወረቀት ያለ ፍቃድ ወይ ክፍያ ለ ግላዊ ወይ ለ ቤት ዉስጥ ፍጆታ ሊባዛ የሚችል ነዉ

ለላ ቅጂ የዚ ወረቀት ክፈለጉ በዚ ቀጥሎ ባለ ውብሳይት ይመልከቱ
www.healthpublications.gov.uk/Home.html ከድ ናይ

ፍርድት፡ 3219250 ወይ ቱሊፎን፡ 0300 123 1002
ሚኒኮም፡ 0300 123 1003 (8 ጥዋት እስከ 6 ከሰዓት፣ ሰኞ እስከ ኣርብ)

